

คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการเสี่ยงหลอดก่อนกำเนิด

-หากในสภาวะดังนี้ทำให้เจ้าตัวน้อยต้องบ้าร้าย การรักษาในท่านชุดหลอดและเกิดวิถีการคลอดก่อนกำหนด นั่นคือการคลอดก่อนกำหนดสเปด้าหรือที่ ลาก ของการตั้งครรภ์ เนื่องมาจากอาชญากรรมและโรคประจัติของมารดา ความผิดปกติของโครงร่างไม่สมบูรณ์และต้องรอการผ่าตัด ตั้งแต่นั้นการฝ่าฟันกระชากและพัฒนาอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อต้องผ่าตัดเชื้อ จะทำให้น้ำนมออกมาก ห้องคลอดก่อนกำหนดได้ รบกวน

เมื่อไหร่เรียกคลอดก่อนกำเนิด??

เป็นภัยการณ์คลอดก่อนกำหนดครรภ์ ครบ สปดาห์ ซึ่งทางร่างกายเหล่านี้ถึงแม้ว่าอวัยวะต่าง ๆ ครบ สมบูรณ์ แต่การทำงานของอวัยวะเหล่านี้จะไม่เต็มที่ เท่าครรภ์กำหนด ซึ่งช่วงหลังคลอดมักต้องการการดูแลเป็นพิเศษและต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าปกติ

ปัจจัยเสี่ยงการคลอดก่อนกำเนิด

๑. มารดา

-อายุของมารดา márดาอยู่น้อยเดินไปปีต่อน้อยกว่า ๓๕ ปี หรือมารดาที่อยู่มากกว่า ๓๕ ปี ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจคลอดก่อนกำหนด
-โรคประจำตัวของมารดา เช่น เบาหวาน cukorbetegség โลหิตสูง หัวใจ

-มีประวัติเคยคลอดก่อนกำหนด

น้ำนมกำกว่าปกติ เป็นต้น

-มดลูกไม่มีความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ปากมดลูกเล็ก รยางค์ห่าง ระยะห่าง ระยะห่าง ระหว่างมดลูกและตำแหน่ง胎盤ในครรภ์เพื่อปรับเปลี่ยนความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด
๒. ตรวจ Ultrasound เพื่อวัดความยาวและตรึงร่างของปากคลอดในการประเมินภาวะครรภ์เสี่ยงและโอกาสคลอดก่อนกำหนด
๓. เจาะหัวนม้ำนม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของนม และภาวะติดเชื้อต่าง ๆ



ภัยธรรมชาติคลอดก่อนกำหนด

๑. ตรวจภายใน โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก ความกว้าง ระยะห่าง ขนาดตัวและตำแหน่ง胎盤ในครรภ์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด
๒. ตรวจ Ultrasound เพื่อวัดความยาวและตรึงร่างของปากคลอดในการประเมินภาวะครรภ์เสี่ยงและโอกาสคลอดก่อนกำหนด
๓. เจาะหัวนม้ำนม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของนม และภาวะติดเชื้อต่าง ๆ

ฉบับรายละเอียดคลอดก่อนกำหนด

- หากทางการคลอดก่อนกำหนดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติและส่งผลต่อระบบร่างกายดังนี้
- ปลด** พับปีกหนาเรื่องการขาดสายดูดผ้าไว้ให้หายใจ คลอดก่อนกำหนด ทำให้หัวร้องแพร่หายใจ หอบและออกตัวอย่างช้าๆ หอบหายใจ
 - หัวใจ** อาจมีปั๊บที่เล็กหรือตื้นที่เข้มต่อระหว่างส่วนเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจที่ออกจาหัวใจเพื่อไปเลี้ยงร่างกายกับส่วนเลือดที่ไม่ถูกอุดตันเป็นอย่าง(PDA) ทำให้พบเลือดผ่านไปสู่หัวใจเป็นผลให้การหายใจหอบและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้
 - สมอง** หัวใจน้ำหนักน้อยกว่า ๑.๕๐๐ กรัม เมื่อวานเสียหายที่จะมีเลือดออกในสมอง เนื้อร่องอกเสียดับประดับด้วย
 - ลำไส้** มีความเปลี่ยนบากกว่าปกติ การย่อยและการดูซึมอาหารยังไม่เต็มทัน ทำให้ต้องให้นมหรือน้ำดื่ม แต่จะต้องให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำร่วมด้วย
 - ความดัน** จะประสาทชาถายไม่สมบูรณ์ หลังเกิดออกจากแม่พิมพ์ของเมืองที่ไม่เกิดสุข อาจเป็นสัญญาณหนึ่งของครรภ์เป็นพิษ

- ปวดหลังช่วงล่างหรือริมฝีด เป็นต้นเมื่อหัวร้อง เป็นน้ำนมฯ แม้จะบ่นเสียงมาก ก็เป็นร่องรอย ๑ เดือนต่อเนื่อง ๔ เดือน ใน ๒๐ นาที หรืออาจเกิดเป็นระยะ ๆ เนื่องจากกรณีลดตัวของดูดถูก แม่พิมพ์หรือเรือเลือดออกทางช่องคลอด
-รู้สึกถูกดันนอนอย่างก่อปั๊ม
-ปวดและความดันไม่คงที่อยู่ เช่น ปวดหัวความดันโลหิตสูง หัวใจ

- มีประวัติเคยคลอดก่อนกำหนด
พัฒนาของเมืองที่ไม่เกิดสุข เช่น อาจเป็นสัญญาณหนึ่งของครรภ์เป็นพิษ